

iviprosil thin films

Συμπλήρωμα διατροφής με αποχρεμπτικές και βλεννολυτικές ιδιότητες για τον παραγωγικό βήχα με εκχύλισμα φύλλων κισσού.

- Ταινίες διασπειρόμενες στο στόμα για εύκολη χρήση.
- Κατάλληλο για παιδιά άνω των δύο ετών.
- Χωρίς αλκοόλη, χωρίς συντηρητικά.

Συνιστώμενη δοσολογία:

- Ενήλικες και παιδιά άνω των 6 ετών: 1 ταινία, 3 φορές ημερησίως, κατά προτίμηση πρωί, μεσημέρι και βράδυ.
 - Παιδιά από 2 έως 5 ετών: 1 ταινία, 2 φορές ημερησίως, κατά προτίμηση πρωί και μεσημέρι.
- Να λαμβάνεται χωρίς νερό.

Κάθε διασπειρόμενη ταινία περιέχει:

Εκχύλισμα φύλλων κισσού 4-8:1 (*Hedera helix* L.): 16 mg
(Ανά 2 ταινίες: 32 mg / Ανά 3 ταινίες: 48 mg)

Συστατικά: Ξηρό εκχύλισμα φύλλων κισσού (*Hedera helix* L.), πολυουλάνη, γλυκερόλη, γεύση φρούτων, διοξειδιο του τιτανίου (E171), σουκραλόζη (E955), άλας με νάτριο της καρβοξυμεθυλοκυτταρίνης, χαλκοχλωροφυλλινικό νάτριο (E141(ii)).

Συσκευασία: 30 φακελάκοι οι οποίοι περιέχουν 1 ταινία έκαστος.

Τρόπος χορήγησης:

- Αφαιρέστε την ταινία από τον φακελάκο χρησιμοποιώντας την εγκοπή στο επάνω μέρος του φακελάκου.
- Μην κόψετε τον φακελάκο.
- Τοποθετήστε την ταινία στη γλώσσα σας (σιγουρευτείτε ότι το στόμα σας είναι άδειο και τα δάχτυλά σας στεγνά).
- Η ταινία θα διαλυθεί στο στόμα σας σε σύντομο χρονικό διάστημα και εν συνεχεία μπορείτε να καταπιείτε κανονικά.
- Για χρήση σε μικρά παιδιά, η ταινία μπορεί να αναδιπλωθεί ώστε να αποκτήσει μικρότερο μέγεθος, πριν την τοποθέτησή της στη γλώσσα του παιδιού.

Προειδοποιήσεις: Να μη γίνεται υπέρβαση της συνιστώμενης ημερησίας δόσης. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μίας ισορροπημένης διαίτας. Το προϊόν αυτό δεν προορίζεται για την πρόληψη, αγωγή ή θεραπεία ανθρώπινης νόσου. Δεν συνιστάται σε εγκύους, γυναίκες που θηλάζουν και παιδιά κάτω των δύο ετών. Μη χρησιμοποιείτε το προϊόν σε περίπτωση που έχετε υπερευαίσθησία σε κάποιο από τα συστατικά του. Συμβουλευτείτε τον γιατρό σας αν βρίσκατε υπό φαρμακευτική αγωγή ή αντιμετωπίζετε προβλήματα υγείας. Το προϊόν πρέπει να φυλάσσεται μακριά από τα μικρά παιδιά.

Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας πριν χρησιμοποιήσετε το iviprosil thin films αν:

- λαμβάνετε ήδη αγωγή κατά του βήχα όπως κωδεΐνη ή δεξτρομεθορφάνη.
- πάσχετε από γαστρίτιδα ή έλκος στομάχου.
- έχετε δυσκολία στην αναπνοή, πυρετό ή αιματηρές βλεννώδεις εκκρίσεις.

Σε περίπτωση που τα συμπτώματα επιμένουν για παραπάνω από μια εβδομάδα κατά τη διάρκεια χρήσης του iviprosil thin films, συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

Οδηγίες φύλαξης: Να φυλάσσεται σε ξηρό περιβάλλον, σε θερμοκρασία που δεν υπερβαίνει τους 25°C, μακριά από τη θερμότητα και την υγρασία. Η αναγραφόμενη ημερομηνία λήξης αναφέρεται στη σωστή διατήρηση του προϊόντος επί άθικτης συσκευασίας.

Αρ. Γνωστ. ΕΟΦ: 84862/04-10-2017

Ο αριθμός γνωστοποίησης στον ΕΟΦ δεν επέχει θέση άδειας κυκλοφορίας από τον ΕΟΦ.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 7793777

Υπεύθυνος Κυκλοφορίας:

Bradex
effective caring

Ασκληπιού 27,145 68 Κρουονέρι Αττικής, Ελλάδα
T: 210 6221801, 210 6220323 F: 210 6221802
E: info@bradex.gr W: www.bradex.gr